

SUCROSE¹

1. Algemene bepalingen van de toelating

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011, wordt de basisstof sucrose toegelaten onder de specifieke voorwaarden zoals vastgelegd in het evaluatieverslag van deze stof (SANCO/12388/2013) als: Plantversterkingsmiddel

2. Kenmerken van de basisstof

CAS-nr.	57-50-1
CIPAC nr. and EEC nr.	200-334-9
FAO specificatie	CODEX STAN 212-1999
Minimale zuiverheid	Voedselkwaliteit
Gebruikswijze	Sucrose, zoals hierboven gespecificeerd moet gebruikt worden in een oplossing van koud water voor toepassing in de verschillende teelten weergegeven onder punt 3.
Te gebruiken oplossing	Sucrose dient te worden verdund volgens de toepassingsdosis beschreven onder punt 3.
Aard werking	Elicitor met een insecticide werking door de stimulering van het natuurlijk afweermechanisme.

3. Gebruik, doseringen en specifieke toepassingsvoorwaarden van de basisstof:

Concentratie en werkzame stof van de formulering: 998 tot 1000 g/kg

Te behandelen: Appel (onbedekte teelt)

Toepassingsstadium: Van het einde van het zwellen van de bladknoppen tot volle bloei (50% van de bloemen zijn open)

Werkzaamheid aannemelijk tegen: Fruitmotje (*Cydia pomonella*)

Dosering: 1 g/hl, 7-10 toepassingen met een interval van 15 dagen

Toepassingsmethode: Bespuiting, 600 – 1000 liter water per hectare.

Opmerkingen: Bladbespuiting toe te passen vroeg in de ochtend voor 9 uur (zonsopkomst).
Oplossing in koud water te bereiden vlak voor toepassing.

Te behandelen: Suikermais (onbedekte teelt)

Toepassingsstadium: Van het stadium 2 bladeren ontvouwen tot begin bloeiwijze zichtbaar

¹ Indien beschikbaar wordt informatie gehaald uit de EU GAP. Indien dit niet beschikbaar is, wordt informatie weergegeven van EFSA of van fytoweb.be.

Werkzaamheid aannemelijk tegen: maïsstengel boorder (*Ostrinia nubilalis*)

Dosering: 1 g/hl, 3-4 toepassingen met een interval van 15 dagen

Toepassingsmethode: Bespuiting, 200 liter water per hectare.

Opmerkingen: Bladbespuiting toe te passen vroeg in de ochtend voor 9 uur . Oplossing in koud water te bereiden vlak voor toepassing.